

Panacur® Plus Tabs.



Reg. SAGARPA: Q-0273-216

Panacur® Susp. 10%



Reg. SAGARPA: Q-0273-167

Tactic®



Reg. Cicoplafest:RSCO-PEC-INAC-179-327-008-013

ANTIPARASITARIOS

Ideal:

- Único tratamiento específico contra la giardiasis, eliminando quistes y trofozoitos, incluso aprobado por la Food Drug Administration (FDA).
- Por su amplia acción contra nematodos, cestodos y protozoarios.
- Para cachorros, gatos y animales adultos.

COMPOSICIÓN: tabletas con 500 mg de fenbendazol y 25 mg de prazicuantel.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS: dependiendo el esquema de tratamiento.

Se recomienda ver instructivo anexo al producto.

PRESENTACIÓN: caja con 6 tabletas.

Ideal:

- Para el tratamiento de la parasitosis en cachorros causada por nematodos y protozoarios.
- Como tratamiento para eliminar la migración de *Toxocara canis* de la madre al cachorro.

COMPOSICIÓN: suspensión oral. Cada ml contiene 100 mg de fenbendazol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS: 50 mg / kg p.v. cada 24 hrs / 3 días (1 ml / 2 kg por 3 días)

ó 100 mg / kg p.v. una sola toma (1 ml / kg dosis única).

PRESENTACIÓN: frasco con 100 ml.

Ideal:

- Como tratamiento en sarna demodexica.
- Como garrapaticida contra cepas resistentes.

COMPOSICIÓN: solución. Cada 100 ml contienen 12.5 g de amitraz.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópica por aspersion.

DOSIS: diluir 2 ml de la solución en 1 litro de agua.

PRESENTACIÓN: frascos con 40 y 200 ml.

Dexafort®



Reg. SAGARPA: Q-0273-065

Quadrisol®5



Reg. SAGARPA: Q-0273-103

ANTIINFLAMATORIOS

Ideal:

- Como soporte en estados de choque (situaciones de estrés por enfermedades infecciosas o parasitarias).
- Opción corticoide con efecto antiinflamatorio por tener un efecto terapéutico prolongado de hasta por 6 días.

COMPOSICIÓN: solución acuosa. Cada ml contiene 1 mg de fosfato sódico de dexametasona y 2 mg de fenilpropionato de dexametasona.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: intramuscular

DOSIS: perros 0.5 a 1 ml; gatos de 0.25 a 0.5 ml.

PRESENTACIÓN: frasco con 50 ml.

Ideal:

- Único AINE en gel oral palatable y combinable con el alimento.
- Acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética en procesos pre y posquirúrgicos.
- Mayor especificidad sobre COX₂.
- En terapias prolongadas por su dosificación ¡una vez al día!

COMPOSICIÓN: gel oral saborizado. Cada ml contiene 5 mg de vedaprofeno.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral, toma directa o mezclado con alimento.

DOSIS: perros: 0.5 mg / kg de p.v. (1 ml / 10 kg de p.v.).

incluso en perros geriátricos y hembras gestantes.

PRESENTACIÓN: jeringa graduable con 15 ml.

Intervet

marca la
diferencia

La línea más completa
y efectiva para la mascota



La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México.
Tel: 01 (713) 1350 300 Fax: 01 (713) 1350 354 www.intervet.com.mx Oficinas Interlomas, Dirección Técnica, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536

Intervet

290403 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional



LINEA FARMACÉUTICOS

QUIMIOTERAPEÚTICOS

Cefa-Cure®



Reg. SAGARPA: Q-0273-104 / Q-0273-105 / Q-0273-106

Ideal:

- En el tratamiento de infecciones del tracto urinario, sistema respiratorio, piel y tejidos blandos.
- Dosificación cada ¡24 horas!, reducción del costo por dosis/día al 50%.
- Por su capa de hemicelulosa disminuye los posibles efectos gástricos.

COMPOSICIÓN: tabletas con 50 mg, 200 mg y 1 000 mg cefadroxilo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.
Dosis: 20 mg / kg p.v.; en infecciones muy severas de piel ó en infecciones recurrentes del T.U.B. 40 mg/kg p.v.
PRESENTACIÓN: caja con 20 tabletas de 50 mg
caja con 20 tabletas de 200 mg
caja con 5 tabletas de 1000 mg.

Albipen® L.A.



Reg. SAGARPA: Q-0273-094

Ideal:

- En el tratamiento y profilaxis de las principales infecciones gastrointestinales, respiratorias, genitourinarias e infecciones secundarias a enfermedades víricas o septicémicas.
- Dosificación cada ¡48 horas!
- Para animales de difícil manejo en medicación oral.

COMPOSICIÓN: solución oleosa. Cada ml contiene 100 mg de ampicilina anhidra.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: subcutánea
Dosis: 15 a 30 mg de principio activo / kg de p.v.
PRESENTACIÓN: frasco irrompible con 80 ml.

Cobactan®



Reg. SAGARPA: Q-0273-127

Ideal:

- En infecciones resistentes a las penicilinas.
- Dosificación cada ¡24 horas!
- Dificulta la inducción a resistencia bacteriana.

COMPOSICIÓN: solución. Cada ml contiene 26.64 mg de sulfato de cefquinome (cefalosporina de cuarta generación)
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: intramuscular y/o subcutáneas
Dosis: 1 mg / kg de p.v. (1 ml / 25 kg de p.v.)
PRESENTACIÓN: frasco con 100 ml.

Biodexamina®



Reg. SAGARPA: Q-0273-070

Ideal:

- Para el tratamiento de neumonías, heridas infectadas, abscesos e infecciones genitourinas.
- Dosificación cada ¡24 horas!
- Actividad antimicrobiana, antiflogística y antialérgica en el mismo producto.

COMPOSICIÓN: suspensión acuosa. Cada ml contiene 200,000 UI de penicilina procaínica, 250 mg de sulfato de dihidroestreptomicina, 1 mg de dexametasona y 10 mg de hidrocloreuro de tripelenamina.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: intramuscular profunda.
Dosis: 1 ml / 10 kg de p.v.
PRESENTACIÓN: frasco irrompible con 100 ml.

Depomycine® 20/20



Reg. SAGARPA: Q-0273-097

Ideal:

- En el tratamiento de infecciones causadas por organismos Gram positivos y Gram negativos como leptospirosis, en artritis y enfermedades respiratorias.
- Por sus potentes antimicrobianos que presentan una excelente sinergia terapéutica.

COMPOSICIÓN: suspensión acuosa. Cada ml contiene 200,000 UI de penicilina procaínica y 200 mg de sulfato de dihidroestreptomicina.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: intramuscular.
Dosis: 1 ml / 10 kg de p.v.
PRESENTACIÓN: frascos irrompibles con 100 y 250 ml.

Oticure®



Reg. SAGARPA: Q-0273-090

Ideal:

- En cualquier infección del conducto auditivo externo causada por bacterias, hongos o levaduras.
- Por su acción antiinflamatoria y antiprurítica.

COMPOSICIÓN: suspensión ótica. Cada ml contiene 50 mg de monosulfiram, 1 mg de dexametasona, 500 U.I. de bacitracina y 5 000 U.I. de sulfato de polimixina B.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Ótica, previa limpieza del conducto auditivo
Dosis: 3 a 5 gotas 2 veces / día
PRESENTACIÓN: frascos cuentagotas de 15 ml.

Covinan®



Reg. SAGARPA: Q-0273-077

Ideal:

- Suprime el sangrado (proestro temprano) y retrasa el celo en perras, gatas y hembras de hurón.
- Ofrece mayor seguridad que los progestágenos de primera generación.
- Seguridad de retorno del ciclo estral.

COMPOSICIÓN: suspensión acuosa. Cada ml contiene 100 mg de proligestona.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: subcutánea.
Dosis: 33 mg / kg de p.v. Se recomienda ver instructivo anexo al producto
PRESENTACIÓN: frasco con 20 ml.

Laurabolín® 20



Reg. SAGARPA: Q-0273-069

Ideal:

- En terapias de estados convalescientes, cirugías, pacientes geriátricos, secuelas de enfermedades víricas y bacterianas, parasitosis, en anemias, agotamiento y debilidad, etc.
- Como apoyo en el manejo de la displasia de cadera, favoreciendo el anabolismo de proteínas.

COMPOSICIÓN: suspensión oleosa de laurato de nandrolona y 1 ml de vehículo oleoso c.b.p.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: intramuscular.
Dosis: perros: 20 mg / 10 kg de p.v. (1 ml / 10 kg de p.v.)
gatos: 10 mg / animal (equivalen a 0.5 ml).
PRESENTACIÓN: frascos con 10, 50 y 100 ml.

ANESTÉSICOS

Servacaina®



Reg. SAGARPA: Q-0273-007

Ideal:

- Como anestésico local o regional en caudectomias, suturación de heridas, en analgesia epidural, bloqueo plexobraquial, etc.
- La combinación de su fórmula permite mayor tiempo de acción.

COMPOSICIÓN: solución acuosa. Cada 100 ml contienen 2 g de lidocaína y clorhidrato de fenilefrina al.1:10,000.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: infiltración.
Dosis: dependiendo el esquema de tratamiento.
Se recomienda ver instructivo anexo al producto.
PRESENTACIÓN: frasco con 50 ml.